


Calcul stiintific


3. Functii continue

Marina Gorunescu


mgorun@inf.ucv.ro




1. Limite de functii



Fie (X, d) și (X_1, d_1) , două spații metrice,
o funcție $f: A \rightarrow X_1$, unde $A \subset X$ și $x_0 \in A'$;
există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, dacă:
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ astfel încât } \forall x \in A \setminus \{x_0\} \text{ cu } d(x, x_0) < \delta$
avem $d_1(f(x), l) < \varepsilon$.






există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, dacă:

oricare ar fi bila $B_1(l, \varepsilon)$ **există** $B(x_0, \delta = \delta(\varepsilon))$
astfel încât avem:

$$f((A \setminus \{x_0\}) \cap B(x_0, \delta)) \subset B_1(l, \varepsilon).$$






În cazul $(E, \|\cdot\|)$, $(E_1, \|\cdot\|_1)$ spații liniare normate și a funcției $f: A \rightarrow E_1$, $A \subset E$,

există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, $x_0 \in A'$, dacă

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon)$, astfel încât $\forall x \in A \setminus \{x_0\}$ cu $\|x - x_0\| < \delta$, avem $\|f(x) - l\| < \varepsilon$.




exemplu



- Pentru a vizualiza rezultatul cunoscut:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$




vom tabelă pentru început funcția pentru valori la stânga și la dreapta lui zero, suficient de apropiate de zero.

```
»x=[-.1;-.01;-.001;-.0001;0.0001;0.001;0.01;.1];[x,(sin(x))./x]
```






-0.1000	0.9983
-0.0100	1.0000
-0.0010	1.0000
-0.0001	1.0000
0.0001	1.0000
0.0010	1.0000
0.0100	1.0000
0.1000	0.9983




criteriul lui Heine



□ Fie (X, d) și (X_1, d_1) , două spații metrice,
o funcție $f: A \rightarrow X_1$, unde $A \subset X$ și $x_0 \in A'$;
următoarele afirmații sunt echivalente:

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

2. oricare ar fi sirul $(x_n)_n \subset A \setminus \{x_0\}$ convergent
la x_0 , avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$



exemple


- Nu există $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$, deoarece considerând sirurile

convergente la zero $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ și $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, $n \in \mathbb{N}$

avem:

$$f(x_n) = \sin \frac{1}{x_n} = \sin 2n\pi = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$$



$$f(y_n) = \sin \frac{1}{y_n} = \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 1.$$





```
x = [-.1;-.01;-.001;-.0001;.0001;.001;.01;.1];[x,sin(1./x)]
```

```
ans =
```

-0.1000	0.5440
-0.0100	0.5064
-0.0010	-0.8269
-0.0001	0.3056
0.0001	-0.3056
0.0010	0.8269
0.0100	-0.5064
0.1000	-0.5440







- nu există $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$


restricționăm funcția $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ la multimea

$\{(x,y) | y = m \cdot x\}, m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ și avem:

$$f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2 x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

Restricția funcției depinde doar de parametrul real m deci nu există limită.





considerând sirurile convergente la $(0,0)$,

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \text{ și } (x'_n, y'_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n} \right), \quad n \in \mathbb{N}^*$$


avem


$$f((x_n, y_n)) = \frac{1}{2}, \quad f((x'_n, y'_n)) = \frac{2}{5}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f((x_n, y_n)) = \frac{1}{2} \quad \text{și} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f((x'_n, y'_n)) = \frac{2}{5}.$$










Fie (X, d) un spațiu metric, $(E, \| \cdot \|)$ un spațiu liniar normat
funcțiile $f, g: A \rightarrow E$, unde $A \subset X$ și $x_0 \in A'$.

Folosind criteriul lui Heine putem demonstra că:


- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha \cdot f)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, unde $\alpha: A \rightarrow \mathbb{R}$.



Fie spațiile metrice (X, d) , (X_1, d_1) , (X_2, d_2) , funcțiile $f : A \rightarrow X_1$ și $g : B \rightarrow X_2$, unde $A \subset X$, $B \subset X_1$, $f(A) \subset B$ și $x_0 \in A'$; dacă există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ și $\lim_{y \rightarrow l} g(y) = l_1$, atunci există $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = l_1$.





calculul limitelor de funcții



- Fie $f: A \rightarrow \mathbf{R}^m$, $A \subset \mathbf{R}$ dată de $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$, unde $f_k: A \rightarrow \mathbf{R}$, $1 \leq k \leq m$.

Dacă $x_0 \in A'$ avem $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l = (l_1, l_2, \dots, l_m) \in \mathbf{R}^m$ dacă și numai dacă $\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = l_k$, $1 \leq k \leq m$.







□ Pentru funcțiile $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ ce au următoarele proprietăți:

- $|f(x_1, x_2, \dots, x_n)| \leq g(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$
- $\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow x_0} g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in A'$

avem $\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow x_0} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.





- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \cdot y}{x^2 + y^2} = 0$, deoarece



folosind inegalitatea $\frac{|a \cdot b|}{a^2 + b^2} \leq \frac{1}{2}$ avem:

$$\frac{|x^2 \cdot y|}{x^2 + y^2} = \frac{|x \cdot y|}{x^2 + y^2} \cdot |x| \leq \frac{1}{2} \cdot |x| \text{ și } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \cdot |x| = 0.$$



- $$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4 + x^4 \cdot y^4)}{x^4 + y^4}$$



$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + u)}{u} = 1$$




$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4 + x^4 \cdot y^4)}{x^4 + y^4} =$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4 + x^4 \cdot y^4}{x^4 + y^4} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 + \frac{x^4 \cdot y^4}{x^4 + y^4} \right) = 1$$

$$\frac{x^4 \cdot y^4}{x^4 + y^4} = \frac{x^2 \cdot y^2}{x^4 + y^4} \cdot x^2 \cdot y^2 \leq \frac{1}{2} \cdot x^2 \cdot y^2$$




Tema 3.1




1. Studiați existența următoarelor limite:

o $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctg x^2 \cdot y^2}{x^4 + y^4};$

o $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^4 \cdot y^4 + 1} - 1}{x^4 + y^4}$




2. Funcții continue




Fie (X, d) și (X_1, d_1) două spații metrice, o funcție
 $f: A \rightarrow X_1$, unde $A \subset X$;

f este **continuă** în $x_0 \in A \cap A'$ dacă

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ astfel încât } \forall x \in A \text{ cu } d(x, x_0) < \delta \text{ avem}$
 $d_1(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.







f este continuă în x_0 dacă și numai dacă există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ și este egală cu $f(x_0)$.



*Dacă funcția $f: A \rightarrow X_1$ este continuă în fiecare punct din A spunem că f este **continuă pe A** .*






Fie $(E, \|\cdot\|)$, $(E_1, \|\cdot\|_1)$ spații liniare normate și funcția

$f: A \rightarrow E_1$, $A \subset E$;



f este continuă în $x_0 \in A \cap A'$, dacă

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ astfel încât } \forall x \in A \text{ cu } \|x - x_0\| < \delta, \text{ avem}$
 $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$




exemplu

- Fie $(E, \|\cdot\|)$ spațiu liniar normat; norma $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ este o funcție continuă pe E :
fie $\varepsilon > 0$, determinăm un $\delta = \delta(\varepsilon)$ astfel încât $\forall x \in E$ cu
 $\|x - x_0\| < \delta$ să avem $|\|x\| - \|x_0\|| < \varepsilon$.
deoarece $|\|x\| - \|x_0\|| < \|x - x_0\|$, obținem $\delta = \varepsilon$.



prelungirea prin continuitate




Fie $f: A \rightarrow X_1$, $A \subset X$ și $x_0 \in A' \setminus A$; dacă există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$,


se poate construi funcția $g: A \cup \{x_0\} \rightarrow X_1$, continuă în x_0 ,

dată de
$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), & x = x_0 \end{cases}$$

prelungirea prin continuitate a lui f în x_0 .




exemple




- Funcția $f_1 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow [-1,1]$, $f_1(x) = \sin \frac{1}{x}$ nu poate fi prelungită prin continuitate în $x_0 = 0$, neexistând $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.
- Funcția $f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2(x) = x \cdot \sin \frac{1}{x}$ poate fi prelungită prin continuitate în $x_0 = 0$, deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$

$$g(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$




criteriul lui Heine



- Fie (X, d) și (X_1, d_1) , două spații metrice,
o funcție $f: A \rightarrow X_1$, unde $A \subset X$ și $x_0 \in A' \cap A$;
următoarele afirmații sunt echivalente:
 1. f este continuă în x_0 ;
 2. oricare ar fi sirul $(x_n)_n \subset A$, convergent la x_0 ,
avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$




operatii cu functii continue






Fie (X, d) un spațiu metric, $(E, \| \cdot \|)$ un spațiu liniar normat
funcțiile $f, g: A \rightarrow E$, unde $A \subset X$ și $x_0 \in A \cap A'$.

- Dacă funcțiile f și g sunt continue în x_0 , atunci
funcția $f + g$ este continuă în x_0 ;
- Dacă funcția f și funcția $\alpha: A \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue
în x_0 , atunci funcția $\alpha \cdot f$ este continuă în x_0 .




$C(A) = \{f: A \rightarrow E, f$ continuă pe $A\}$,
înzestrată cu operațiile de adunare și înmulțire cu scalar, $\text{ este un spațiu vectorial real.}$






Fie spațiile metrice (X, d) , (X_1, d_1) , (X_2, d_2) , funcțiile $f: A \rightarrow X_1$ și $g: B \rightarrow X_2$, unde $A \subset X$, $B \subset X_1$, $f(A) \subset B$ și $x_0 \in A' \cap A$; dacă există f este continuă în x_0 și g este continuă în $f(x_0)$, atunci $g \circ f$ este continuă în x_0 .

Componerea a două funcții continue este o funcție continuă.




multime compactă




Într-un spațiu metric (X, d) , mulțimea K este **compactă** dacă orice sir din K conține un subșir convergent în K .


Într-un spațiu metric (X, d) mulțimea $A \subset X$ este **închisă** dacă limita oricărui sir convergent din A aparține lui A .



exemple

- Orice interval $[a,b] \subset \mathbb{R}$ este o mulțime compactă.
- În \mathbb{R}^n o mulțime este compactă dacă și numai dacă este mărginită și închisă.





- **Fie $(X, d), (X_1, d_1)$ spații metrice $(X, d), (X_1, d_1)$;**
dacă funcția $f: A \rightarrow X_1$, $A \subset X$ este continuă, atunci
imaginea prin f a unei multimi compacte $K \subset A$, este o
multime compactă.



exemplu



- Graficul unei funcții continue $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$,


$$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\}$$

este o mulțime compactă.

Construim funcția vectorială $h:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (x, f(x))$,
funcție ce este continuă.

$G_f = h([a,b])$, deci este compactă







- Dacă o funcție reală, definită pe o mulțime compactă K , dintr-un spațiu spațiu metric (X, d) este continuă pe K , atunci este mărginită pe K și își atinge marginile.

Funcția f își atinge **marginea superioară**, respectiv **inferioară** dacă există $x_1, x_2 \in K$ astfel încât:


$$f(x_1) = \sup_{x \in K} f(x) = \sup f(K) \text{ și } f(x_2) = \inf_{x \in K} f(x) = \inf f(K),$$



functie uniform continua






Fie (X, d) și (X_1, d_1) , două spații metrice;
o funcție $f: X \rightarrow X_1$ este **uniform continuă** pe $A \subset X$
dacă:
 $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ astfel încât } \forall x_1, x_2 \in A \text{ cu } d(x_1, x_2) < \delta$
avem $d_1(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.






exemple

$f(x)=\ln x$ nu este uniform continua pe $(0,e)$





$f(x)=x+\sin x$ este uniform continua pe $(0,35)$





O funcție uniform continuă pe A este continuă în orice punct din A

Reciproca nu este adevărată.





funcție lipschitziana


Fie (X, d) și (X_1, d_1) , două spații metrice;
o funcție $f: A \rightarrow X_1$, $A \subset X$ este funcție **lipschitziană**
dacă există $L > 0$ astfel încât
 $d_1(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d(x_1, x_2)$, $\forall x_1, x_2 \in A$.




exemplu

- O funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă, cu derivata mărginită pe $A \subset \mathbb{R}$ este lipschitziană pe A .









- O funcție lipschitziană este uniform continuă
- Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = 2x - 3 \cos x$ având derivata mărginită $|f'(x)| = |2 + 3 \sin x| \leq 5$, este lipschitziană, deci uniform continuă pe \mathbb{R} .



$f(x)=2*x-3*\cos(x)$ este uniform continua pe \mathbb{R}







Dacă funcția $f: A \rightarrow X_1$, $A \subset X$ este uniform continuă pe A , atunci este uniform continuă pe orice submulțime $A_1 \subset A$.

- Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = 2x - 3 \cos x$ este uniform continuă pe $(-10\pi, 10\pi) \subset \mathbb{R}$.










- O funcție $f:(a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $(a,b) \subset \mathbb{R}$, continuă pe (a,b) care admite asimptotă verticală $x=a$ sau $x=b$ nu este uniform continuă pe (a,b) .
- Funcția $f(x) = 2^{\frac{1}{x-1}}$ nu este uniform continuă pe $(1,+\infty)$ deoarece $x=1$ este asimptotă verticală ($\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} 2^{\frac{1}{x-1}} = +\infty$).






$f(x)=2^{(1/(x-1))}$ nu este uniform continua pe $(1, \infty)$




- O funcție $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodică și continuă este uniform continuă pe \mathbb{R} .
- Funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow [1,3]$, definită prin $f(x) = 2 + \sin 2x$ este continuă, periodică, de perioadă $T = \pi$, deci uniform continuă pe \mathbb{R} .




$f(x)=2+\sin(2*x)$ este uniform continua pe R









- O funcție continuă $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, al cărei grafic admite asimptote orizontale la $-\infty$ și la $+\infty$, este uniform continuă pe \mathbb{R} .
- Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = \frac{2x - 1}{\sqrt{x^2 + 4}}$ este continuă pe \mathbb{R} și admite asimptote orizontale $y = 2$ la $+\infty$ și $y = -2$ la $-\infty$.



$f(x) = (x-1)/\sqrt{x^2+4}$ este uniform continua pe \mathbb{R}






- O funcție continuă $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, al cărei grafic admite asimptote oblice la $-\infty$ și la $+\infty$, este uniform continuă pe \mathbb{R} .




- Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$ este continuă pe \mathbb{R} și:

$y = x - \frac{1}{2}$ este asimptotă oblică la $+\infty$.



$y = -x + \frac{1}{2}$ este asimptotă oblică la $-\infty$






$f(x)=\sqrt{x^2-x+1}$ este uniform continua pe \mathbb{R}




- Fie (X, d) , (X_1, d_1) spații metrice și $K \subset X$ o mulțime compactă; dacă funcția $f: K \rightarrow X_1$ este continuă pe K , atunci este uniform continuă pe K .
- Funcția $f: (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x) = \ln(x - 2)$ este uniform continuă pe $[3, 10]$, fiind continuă pe acest compact.




$f(x)=\ln(x-2)$ este uniform continua pe $[3,10]$







- Funcția $f:(1,\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x-1}}$ este continuă pe $[3,4]$, deci va fi uniform continuă pe această mulțime compactă, și pe orice submulțime a sa, adică și pe $(3,4)$.



$f(x) = (x+2)/\sqrt{x-1}$ este uniform continua pe $(3,4)$




transfer de continuitate siruri de functii



- Considerăm două spații metrice (X, d) și (X_1, d_1) ; funcția limită a unui sir de funcții $(f_n)_n$, $f_n : A \rightarrow X_1$ continue pe $A \subset X$, uniform convergent pe A , este continuă pe A .

Altfel spus: limita uniformă a unui sir de funcții continue este o funcție continuă.





exemplu

- Funcția limită a sirului de funcții $(f_n)_n$, unde $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



$$f_n(x) = \frac{x^{2n+1} - x + 1}{x^{2n} + \sqrt{1+x^2}}$$


este $f(x) = \begin{cases} \frac{-x+1}{\sqrt{1+x^2}}, & |x| < 1 \\ \frac{1}{1+\sqrt{2}}, & x = 1 \\ x, & |x| > 1 \end{cases}$

Acest sir nu este uniform convergent pe $[0,3]$, deoarece funcțiile f_n sunt continue pe $[0,3]$, dar funcția limită nu este.




```
>>x=0:.1:1;x1=1:.1:3;plot(x,(x.^3*x+1)./(x.^2+sqrt(1+x.^2)), 'g', x,(x.^1  
1-x+1)./(x.^10+sqrt(1+x.^2)), 'k', x,(1-x)./sqrt(1+x.^2), 'r', x1,(x1.^3-  
x1+1)./(x1.^2+sqrt(1+x1.^2)), 'g', x1,(x1.^11*x1+1)./(x1.^10+sqrt(1+x1.  
^2)), 'k', x1, 'r', 1, 1/(1+sqrt(2)), 'r')
```






transfer de continuitate serii de funcții





- Fie (X, d) un spațiu metric, $(E, \| \cdot \|)$ un spațiu Banach și un sir de funcții $f_n : A \rightarrow E, n \in \mathbb{N}, A \subset X$;
dacă $\sum_{n \geq 1} f_n$ este uniform convergentă pe A și termenii ei sunt funcții continue pe A , atunci suma sa, s , este o funcție continuă pe A .



exemple

- am demonstrat cu criteriul lui Weierstrass convergența uniformă pe \mathbb{R} a seriei de funcții $\sum_{n \geq 0} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 + n^6}$:
funcțiile $f_n(x) = \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 + n^6}$ sunt continue pe \mathbb{R} și astfel putem afirma că suma seriei este o funcție continuă pe \mathbb{R} .





Teorema Weierstrass

- Dacă $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă, atunci există un sir de polinoame $(P_n)_n$, care converge uniform la f pe $[a,b]$.

Ne situam în cazul intervalului $[0,1]$; transformarea $[a,b] \rightarrow [0,1]$

dată de $t = \frac{x-a}{b-a}$ păstrează polinoamele.





Se consideră polinoamele *Bernstein* asociate funcției f :

$$B_n(x) = \sum_{m=0}^n f\left(\frac{m}{n}\right) \cdot C_n^m \cdot x^m \cdot (1-x)^{n-m},$$


polinoame ce converg uniform la f , pe $[0,1]$.




exemplu

Pentru funcția $f(x) = \ln(1 + x)$, $x \in [0,1]$
polinomul Bernstein de gradul 5 este


$$B_5(x) = \sum_{m=0}^5 \ln\left(1 + \frac{m}{5}\right) \cdot C_5^m \cdot x^m \cdot (1-x)^{5-m}$$







Curbe


Funcția vectorială $\gamma:[a,b] \rightarrow \mathbf{R}^2$ $\gamma(t) = (f(t), g(t))$, continuă pe $[a,b]$ se numește **curbă** parametrizată în \mathbf{R}^2 ; funcția vectorială continuă $\gamma:[a,b] \rightarrow \mathbf{R}^3$ $\gamma(t) = (f(t), g(t), h(t))$ este o **curbă** în \mathbf{R}^3



ecuațiile parametrice ale curbelor


$\gamma: \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$ respectiv $\gamma: \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases} \quad t \in [a, b].$





Imaginea $\gamma([a,b]) = (\gamma) \subset \mathbb{R}^2$ se numește **urma** (traекторia) curbei γ ;

$\gamma(a)$ și $\gamma(b)$ sunt **capetele curbei**,
dacă $\gamma(a) = \gamma(b)$, γ este o **curbă închisă**.



exemple


- Identificând \mathbf{R}^2 cu planul xOy , urma curbei

$$\gamma: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbf{R}^2, \gamma(t) = (\cos t, \sin t)$$



este sfertul de cerc unitate (cu centru în origine, de raza 1) situat în primul cadran


$$(\gamma) = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2, x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

Capetele curbei sunt punctele $(1,0), (0,1)$.




- Curba $\gamma:[0,2\pi] \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 3)$
este închisă având capetele $\gamma(0) = \gamma(2\pi) = (1,0,3)$;
are ca urmă cercul $\{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3, x^2 + y^2 = 1, z = 3\}$.






Pentru $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^m$, $m \in \{2, 3\}$, curbă parametrizată fixată, putem defini $\gamma^- : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^m$, prin $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$, curbă numită **opusă** curbei γ .

Urmele curbelor γ și γ^- coincid.







Dacă $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ și $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{R}^m$ sunt două curbe parametrizate în \mathbb{R}^m , $m \in \{2, 3\}$, cu proprietatea că $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ putem defini curba:

$\gamma_1 \cup \gamma_2 : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}^m$, dată de: $(\gamma_1 \cup \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t), & t \in [b, c] \end{cases}$

numit **juxtapunerea** curbelor γ_1 și γ_2 .

Urma lui $\gamma_1 \cup \gamma_2$ este reuniunea $(\gamma_1) \cup (\gamma_2)$.






Dacă $F: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^2$ este o funcție continuă, mulțimea


$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$$

este urma unei curbe în \mathbb{R}^2

$F(x, y) = 0$ se numește ecuația carteziană a curbei.




coordonate polare





Problema de rezolvat: a obține ecuațiile parametrice ale unei curbe definite prin ecuația carteziană.

ecuațiile ce leagă coordonatele carteziene (x, y) de coordonatele polare (r, t) :

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos t \\ y = r \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi], r \geq 0$$





- scriem ecuația curbei în coordonate polare $r = \varphi(t)$;
- înlocuim pe r cu $\varphi(t)$ în formulele (*).




exemple

Mulțimea $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = a^2\}$ este cercul cu centrul în origine, de rază a . Ecuatăia acestui cerc în coordonate polare este $r = a$ și astfel ecuațiile parametrice ale cercului sunt:

$$\begin{cases} x = a \cdot \cos t \\ y = a \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$






Pentru a scrie ecuațiile parametrice ale elipsei


$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ folosim coordonate polare generalizate:

$$\begin{cases} x = a \cdot r \cdot \cos t \\ y = b \cdot r \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

Ecuăția elipsei în coordonate polare generalizate este $r = 1$ și ecuațiile parametrice sunt:

$$\begin{cases} x = a \cdot \cos t \\ y = b \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$







Ecuatia **cardioidei** in coordonate polare este
 $r = 1 + \cos t, \quad t \in [-\pi, \pi]$
si astfel ecuatiile parametrice vor fi

$$\begin{cases} x = (1 + \cos t) \cdot \cos t \\ y = (1 + \cos t) \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in [-\pi, \pi].$$





problemă



Mulțimea $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = a^2\} \subset \mathbb{R}^2$ este o mulțime compactă.


Avem $M = \gamma([0, 2\pi])$ unde $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definită de $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$.

Funcția vectorială γ este continuă, componentele sale $f, g: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(t) = \cos t, g(t) = \sin t$ fiind funcții continue

Imaginea compactului $[0, 2\pi]$ prin γ este o mulțime compactă.




Aplicatii liniare si continue




O aplicație $T: V \rightarrow V_1$ între două spații vectoriale reale V, V_1 este *liniară* dacă satisface relația

$$T(\alpha \cdot x + \beta \cdot x') = \alpha \cdot T(x) + \beta \cdot T(x'), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \forall x, x' \in V.$$

In cazul unei aplicații liniare T scriem Tx în loc de $T(x)$.



exemplu





Considerăm sistemul liniar de m ecuații cu n necunoscute:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

și definim o aplicație liniară $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, dată de:


$$T(x_1, \dots, x_n) = (a_{11} \cdot x_1 + \dots + a_{1n} \cdot x_n, \dots, a_{m1} \cdot x_1 + \dots + a_{mn} \cdot x_n).$$






problema rezolvării acestui sistem de ecuații devine:

fiind dat vectorul (b_1, \dots, b_m) , să găsim acei vectori (x_1, \dots, x_n) care verifică relația $T(x_1, \dots, x_n) = (b_1, \dots, b_m)$.





(V, V_1) este multimea tuturor aplicațiilor liniare ce aplică pe V în V_1 ,

(V, V_1) formează un spațiu liniar față de corpul \mathbb{R} , definind:

$$(T_1 + T_2)(x) = T_1 x + T_2 x, \forall x \in V$$


și


$$(\alpha \cdot T)(x) = \alpha \cdot Tx, \forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$



Elementul nul al acestui spațiu, notat O , se numește **aplicația nulă** și este dat de formula:

$$Ox = \theta_{\mathbb{K}}, \forall x \in V.$$






considerăm spațiile vectoriale V, V_1 cu bazele
 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ respectiv $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ și aplicația
 $T \in (V, V_1)$.

Elementul $x \in V$ poate fi scris în baza $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

$$x = \sum_{k=1}^n x_k \cdot v_k$$

atunci:





$$y = Tx = T\left(\sum_{k=1}^n x_k \cdot v_k\right) = \sum_{k=1}^n x_k \cdot Tv_k =$$

$$\sum_{k=1}^n x_k \cdot \left(\sum_{j=1}^m a_{jk} \cdot w_j\right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{jk} \cdot x_k\right) \cdot w_j$$

Din $y = \sum_{j=1}^m y_j \cdot w_j$ obținem

$$y_j = \sum_{k=1}^n a_{jk} \cdot x_k, 1 \leq j \leq m$$





Aplicația T este caracterizată prin coeficienții a_{jk} .

Din formula ce dă legătura între coordonatele lui y și
coordonatele lui x


$$y_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n$$

$$y_2 = a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n$$

.....


$$y_m = a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n$$

obținem:



matricea asociată aplicației liniare T :

$$M_T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$






exemple

Matricea aplicației nule are toate elementele 0.

Matricea aplicației identitate este $I_n =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$






Unei aplicații liniare $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ i se asociază matricea

$$M_T = (Te_1, Te_2, \dots, Te_n),$$


unde $\{e_1, \dots, e_n\}$ este baza uzuală din \mathbb{R}^n , adică vectorii Te_i formează coloanele lui M_T .






Fiind date spațiile vectoriale V, V_1 și V_2 , compunerea aplicațiilor liniare $T \in (V, V_1)$, $T_1 \in (V_1, V_2)$, $T_1 \circ T$ este tot o aplicație liniară.


Matricea asociată aplicației liniare $T_1 \circ T$ este produsul matricelor asociate aplicației liniare T_1 , respectiv T , adică matricea $M_{T_1} \cdot M_T$.




aplicatie liniara si continua




Dacă $(E, \|\cdot\|)$ și $(E_1, \|\cdot\|_1)$ sunt spații liniare normate, aplicația liniară $T: E \rightarrow E_1$ este **continuă** în $x_0 \in E$ dacă $\forall \varepsilon > 0$ există $\delta > 0$ astfel încât $\|x - x_0\| < \delta$ implică $\|Tx - Tx_0\|_1 < \varepsilon$.





- Aplicația liniară $T: E \rightarrow E_1$ este continuă pe E dacă și numai dacă este continuă într-un singur punct.




Aplicația liniară $T: E \rightarrow E_1$ este **mărginită** dacă există un număr pozitiv M astfel încât $\|Tx\|_1 \leq M \cdot \|x\|$, $\forall x \in E$.



- Condiția necesară și suficientă ca aplicația liniară $T : E \rightarrow E_1$ să fie continuă este ca T să fie mărginită.





- Orice aplicație liniară $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este continuă.

deoarece:

Dacă $x = (x_1, \dots, x_n)$ avem $Tx = \left(\sum_{k=1}^n a_{1k} \cdot x_k, \dots, \sum_{k=1}^n a_{mk} \cdot x_k \right)$



unde (a_{ij}) , $1 \leq j \leq m, 1 \leq i \leq n$ este matricea asociată
aplicației liniare T ; evaluăm $\|Tx\|$




aplicăm inegalitatea Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned}\|Tx\|^2 &= \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{jk} \cdot x_k \right)^2 \leq \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{jk}^2 \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) = \\ &= \|x\|^2 \cdot \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n a_{jk}^2\end{aligned}$$

și astfel am determinat $M = \sqrt{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n a_{jk}^2}$.






Dacă $(E, \|\cdot\|)$ și $(E_1, \|\cdot\|_1)$ sunt spații liniare normate, notăm cu $L(E, E_1)$ mulțimea tuturor aplicațiilor liniare și continue de la E la E_1 .

Mulțimea $L(E, E_1)$ este subspațiu liniar al lui (E, E_1) .

Putem defini o normă pe $L(E, E_1)$ prin $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$.



Principiul contractiilor




Intr-un spațiu metric (X, d) , o funcție $f: A \rightarrow X$, $A \subset X$ este o **contractie** dacă există $C \in (0, 1)$, astfel încât:

$$d(f(x_1), f(x_2)) \leq C \cdot d(x_1, x_2), \forall x_1, x_2 \in E.$$




teorema de punct fix




- Dacă într-un spațiu metric complet, funcția $f:A \rightarrow X$, $A \subset X$ mulțime închisă, este o contractie, atunci f admite un punct fix unic \bar{x} , adică $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

În plus, alegând x_0 un punct oarecare din A , sirul:
 $x_0, x_1 = f(x_0), \dots, x_{n+1} = f(x_n), \dots$ converge la \bar{x} și avem:

$$d(x_n, \bar{x}) \leq \frac{C^n}{1-C} \cdot d(x_0, f(x_0))$$



exemplu



Studiem convergența sirului definit prin relația de recurență:

$$x_0 = 7, x_{n+1} = \frac{4x_n^2 + 1}{5x_n}, n \geq 0,$$

folosind principiul contracților:



Considerăm funcția $f:[10^{-5}, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin



$$f(x) = \frac{4x^2 + 1}{5x};$$

Calculând $f'(x) = \frac{4}{5} - \frac{1}{5x^2}$, avem $|f'(x)| < \frac{4}{5}$, $\forall x \geq \frac{1}{10^5}$

și din teorema creșterilor finite obținem:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{4}{5} \cdot |x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \geq \frac{1}{10^5}$$



deci f este o contracție.



Şirul în studiu este şirul aproximărilor succesive din principiul contracţiilor, pentru funcţia $f(x) = \frac{4x^2 + 1}{5x}$ şi converge la punctul fix al funcţiei:

$$x = \frac{4x^2 + 1}{5x}, \text{ în multimea } [10^{-5}, \infty).$$

În concluzie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.





Tema 3.2

1. Studiați existența următoarelor limite:

o $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctg x^2 \cdot y^2}{x^4 + y^4};$

o $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^4 \cdot y^4 + 1} - 1}{x^4 + y^4}$



2. Se poate prelungi prin continuitate, în origine,
funcția

$$h(x,y) = \left(1 + x^2 \cdot y^4\right)^{\frac{1}{x^4+y^8}} \quad ?$$


3. Precizați care din funcțiile următoare este uniform
continuă, pe mulțimile indicate, justificând răspunsurile:

o $f_1(x) = x + \arctg x, x \in \mathbb{R};$

o $f_5(x) = \sqrt{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R};$

o $f_6(x) = \frac{1}{x\sqrt{9-x^2}}, \quad x \in (1,2);$

o $f_7(x) = \frac{x^3 + 2}{x^2 - x + 5}, x \in \mathbb{R};$





4. Este sirul de functii $(f_n)_n$, unde $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este definită prin

$$f_n(x) = \frac{(x^2 + 2) \cdot e^{nx} - \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{e^{nx+1} + \sqrt{x^2 + 1}}, n \in \mathbb{N},$$

uniform convergent pe $[-1,1]$?

5. Este suma seriei $\sum_{n \geq 1} \frac{2 \cdot (-1)^{n+1} \cdot x^n}{n^5 + x^4}$ o funcție continuă pe \mathbb{R} ?




6. Scrieți ecuațiile parametrice ale curbelor ale căror ecuații în coordonate carteziene sunt:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \operatorname{arctg} \frac{y}{x};$$

$$x^2 + y^2 - y = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

7. Este multimea $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ o multime compactă? Argumentați temeinic răspunsul.



8. Folosind principiul contractiilor, studiați convergența sirului definit prin relația de recurență

$$x_0 = 3, x_{n+1} = \frac{2x_n^2 - 2x_n + 1}{5x_n}, n \geq 1$$

